

**Tantum Verde cu aromă de lămâie 3 mg pastile**  
clorhidrat de benzidamină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Tantum Verde cu aromă de lămâie și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tantum Verde cu aromă de lămâie
3. Cum să utilizați Tantum Verde cu aromă de lămâie
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tantum Verde cu aromă de lămâie
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Tantum Verde cu aromă de lămâie și pentru ce se utilizează**

Tantum Verde cu aromă de lămâie conține clorhidrat de benzidamină și poate fi administrat ca tratament analgezic - antiinflamator în afecțiunile cavității bucale și faringelui la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tantum Verde cu aromă de lămâie****Nu utilizați Tantum Verde cu aromă de lămâie**

- dacă sunteți alergic la clorhidrat de benzidamină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6).

Nu se recomandă administrarea pastilelor la copiii cu vârsta sub 6 ani.

**Atenționări și precauții**

În cazul persistenței simptomelor sau dacă nu se obține rezultatul dorit cu acest tratament este necesar să vă adresați medicului dumneavoastră.

Acest lucru este valabil și în cazul consumării din neatenție a unor doze mari de clorhidrat de benzidamină (de exemplu, în cazul copiilor).

**Tantum Verde cu aromă de lămâie împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Deoarece până în prezent nu au fost semnalate interacțiuni, este posibilă utilizarea concomitentă cu alte medicamente.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament. Nu trebuie să utilizați Tantum Verde cu aromă de lămâie în timpul sarcinii, decât dacă este absolut necesar și la recomandarea medicului dumneavoastră. Dacă tratamentul este necesar, trebuie utilizată cea mai mică doză posibilă pentru cea mai scurtă perioadă de timp.

Utilizarea Tantum Verde cu aromă de lămâie în timpul alăptării este permisă numai la recomandarea medicului dumneavoastră.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Utilizarea Tantum Verde cu aromă de lămâie în dozele recomandate nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

### **Tantum Verde conține izomalt (care este un tip de zahăr).**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

### **Tantum Verde cu aromă de lămâie conține 3,26 mg aspartam per fiecare pastilă.**

Aspartamul este o sursă de fenilalanină. Poate fi dăunător la persoanele cu fenilcetonurie, o afecțiune genetică rară, în care concentrația de fenilalanină este crescută, din cauză că organismul nu o poate elimina în mod corespunzător.

**Acest medicament conține aromă de mentă** cu alcool benzilic, citronelol, d-limonen, eugenol, geraniol, linalool și **aromă de lămâie** cu alcool benzilic, citral, citronelol, d-limonen, geraniol, linalool. Aceștia pot determina reacții alergice.

**Acest medicament conține butilhidroxianisol** care este un component al aromei de lămâie. Poate provoca reacții adverse la nivelul pielii, localizate (de exemplu, dermatită de contact) sau iritație a ochilor sau mucoaselor.

## **3. Cum să utilizați Tantum Verde cu aromă de lămâie**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este de o pastilă Tantum Verde cu aromă de lămâie de 3 ori pe zi.

Nu se recomandă administrarea pastilelor la copiii cu vârsta sub 6 ani. Administrarea pastilelor la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 – 12 ani se face numai sub supravegherea unui adult.

Durata tratamentului

Durata tratamentului nu trebuie să fie mai mare de 7 zile.

### **Mod de administrare**

Se lasă pastilele să se topească în gură.

### **Dacă utilizați mai mult Tantum Verde cu aromă de lămâie decât trebuie**

Trebuie să vă adresați imediat medicului.

### **Dacă uitați să utilizați Tantum Verde cu aromă de lămâie**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Tantum Verde cu aromă de lămâie**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Imediat după administrare este posibilă apariția unei senzații de amorțeală la nivelul gurii și faringelui care face parte din efectul analgezic al medicamentului și dispare după puțin timp.

Astfel de manifestări dispar după oprirea utilizării pastilelor.

**Reacții adverse mai puțin frecvente:** fotosensibilitate

##### **Reacții adverse rare**

- senzație de arsură;
- uscăciune a mucoasei bucale.

##### **Reacții adverse foarte rare**

- spasm la nivelul laringelui;
- umflarea gurii sau gâtului.

##### **Reacții adverse cu frecvență necunoscută**

- Reacții alergice (reacții de hipersensibilitate)
- Reacții alergice severe (șoc anafilactic), semne care pot să includă dificultăți la respirație, durere în piept sau senzație de apăsare în piept și/sau senzație de amețeală/leșin, mâncărimi severe la nivelul pielii sau noduli formați pe piele, umflare a feței, buzelor, limbii și/sau gâtului și care pot pune viața în pericol.

În cazul apariției de reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

##### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucuresti 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Tantum Verde cu aromă de lămâie**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

**MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.**

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

**Ce conține Tantum Verde cu aromă de lămâie**

- Substanța activă este clorhidratul de benzidamină. Fiecare pastilă conține clorhidrat de benzidamină 3 mg.
- Celelalte componente sunt: izomalt (E 953), aspartam (E 951), acid citric monohidrat, aromă de mentă, aromă de lămâie, galben de chinolină (E 104), indigotină (E 132).

**Cum arată Tantum Verde cu aromă de lămâie și conținutul ambalajului**

Tantum Verde cu aromă de lămâie este disponibil sub formă de pastile de culoare galben-verzuie, translucide, de formă pătrată, cu o cavitate centrală, cu gust caracteristic de lămâie.

**Ambalaj**

Cutie cu 2 pachete din hârtie laminată cu aluminiu (polietilenă/hârtie/aluminiu) a câte 10 pastile ambalate individual în hârtie parafinată.

Cutie cu 3 pachete din hârtie laminată cu aluminiu (polietilenă/hârtie/aluminiu) a câte 10 pastile ambalate individual în hârtie parafinată.

Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 pastile.

Cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 pastile.

**Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricanții****Deținătorul autorizației de punere pe piață**

ANGELINI PHARMA S.p.A.

Viale Amelia, 70, 00181 Roma, Italia

**Fabricanți**

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO, A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona

Italia

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Site Diététique et Pharmacie, Zone Industrielle de la Coudette, 32290 Aignan

Franța

**Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2026.**

**Prospect: Informații pentru utilizator****Tantum Verde cu aromă de mentă 3 mg pastile**  
Clorhidrat de benzidamină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Tantum Verde și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tantum Verde
3. Cum să utilizați Tantum Verde
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tantum Verde
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Tantum Verde și pentru ce se utilizează**

Tantum Verde conține clorhidrat de benzidamină și poate fi administrat ca tratament analgezic - antiinflamator în afecțiunile cavității bucale și faringelui la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tantum Verde****Nu utilizați Tantum Verde**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la clorhidrat de benzidamină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).
- dacă sunteți alergic la acid acetilsalicilic și/sau la alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).

**Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Tantum Verde, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Aveți grijă deosebită când luați Tantum Verde:

- dacă aveți un istoric de astm bronșic.

**Tantum Verde împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu s-au semnalat interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament.

Nu trebuie să utilizați Tantum Verde în timpul sarcinii, decât dacă este absolut necesar și la recomandarea medicului dumneavoastră. Dacă tratamentul este necesar, trebuie utilizată cea mai mică doză posibilă pentru cea mai scurtă perioadă de timp.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Utilizarea locală a benzidaminei la dozele recomandate nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Tantum Verde conține izomalt (care este un tip de zahăr).**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament

**Tantum Verde conține 3,5 mg aspartam (E 951) per fiecare pastilă.** Aspartamul este sursă de fenilalanină. Poate fi dăunător la persoanele cu fenilketonurie, o afecțiune genetică rară, în care concentrația de fenilalanină este crescută, din cauză că organismul nu o poate elimina în mod corespunzător.

**Acest medicament conține aromă de mentă** cu alcool benzilic, citronelol, d-limonen, eugenol, geraniol, linalool și **aromă de lămâie** cu alcool benzilic, citral, citronelol, d-limonen, geraniol, linalool. Aceștia pot determina reacții alergice.

**Acest medicament conține butilhidroxianisol** care este un component al aromei de lămâie. Poate provoca reacții adverse la nivelul pielii, localizate (de exemplu, dermatită de contact) sau iritație a ochilor sau mucoaselor.

## **3. Cum să utilizați Tantum Verde**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza uzuală recomandată este de o pastilă Tantum Verde de 3 ori pe zi.

Pentru obținerea efectului maxim, este indicat să se lase pastila să se dizolve în gură.

### *Utilizarea la copii și adolescenți*

Din cauza pericolului de sufocare (prin alunecarea pastilei în căile respiratorii), administrarea pastilelor la copiii între 6-12 ani se face numai sub supravegherea unui adult.

Nu este recomandată administrarea pastilelor la copiii cu vârsta sub 6 ani.

### *Durata tratamentului*

Durata tratamentului nu trebuie să fie mai mare de 7 zile.

Dacă după administrarea Tantum Verde simptomele nu se ameliorează sau se agravează trebuie să discutați cu medicul sau farmacistul dumneavoastră.

### **Dacă utilizați mai mult Tantum Verde decât trebuie**

Trebuie să vă adresați imediat medicului.

### **Dacă uitați să utilizați Tantum Verde**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Tantum Verde**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### 4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Tantum Verde poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

**Reacții adverse mai puțin frecvente** (pot afecta până la 1 din 100 persoane) poate să apară fotosensibilitate (sensibilitate la lumină).

**Reacții adverse rare** (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

Poate să apară senzație de arsură și uscăciune a mucoasei bucale.

Dacă vi se întâmplă dumneavoastră, beți un pahar cu apă pentru a reduce aceste senzații.

**Reacții adverse foarte rare** (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

Trebuie să discutați imediat cu medicul dacă brusc vi se umflă gura sau gâtul, sau apar dificultăți la respirație.

**Reacții adverse cu frecvență necunoscută:**

- reacție alergică (hipersensibilitate)

- reacție alergică gravă (șoc anafilactic), semne care pot include dificultăți de respirație, dureri în piept sau senzație de apăsare în piept și/sau senzație de amețeală/leșin, mâncărime severă a pielii sau noduli formați pe piele, umflare a feței, buzelor, limbii și/sau gâtului și care pot pune viața în pericol.

#### Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucuresti 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### 5. Cum se păstrează Tantum Verde

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau folie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

Nu utilizați Tantum Verde dacă observați semne vizibile de deteriorare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

**MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.**

#### 6. Conținutul ambalajului și alte informații

**Ce conține Tantum Verde**

- Substanța activă este clorhidratul de benzidamină. O pastilă conține clorhidrat de benzidamină 3 mg.
- Celelalte componente sunt: izomalt (E 953), levomentol, aspartam (E 951), acid citric monohidrat, aromă de mentă, aromă de lămâie, galben de chinolină (E 104), indigotină (E 132).

### **Cum arată Tantum Verde și conținutul ambalajului**

Tantum Verde se prezintă sub formă de pastile de culoare verde, translucide, de formă pătrată, cu o cavitate centrală, cu gust caracteristic de mentă.

### **Ambalaj**

Cutie cu 2 pachete din hârtie laminată cu aluminiu a câte 10 pastile ambalate individual în hârtie parafinată

Cutie cu 3 pachete din hârtie laminată cu aluminiu a câte 10 pastile ambalate individual în hârtie parafinată

Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 pastile

Cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 pastile

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

ANGELINI PHARMA S.p.A.

Viale Amelia, 70, 00181 Roma, Italia

#### **Fabricanții**

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona,

Italia

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Site Diététique et Pharmacie, Zone Industrielle de la Coudette

32290 Aignan,

Franța

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață.

**Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2026.**

**PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR****Tantum Verde cu gust de portocală și miere 3 mg pastile**  
Clorhidrat de benzidamină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Tantum Verde cu gust de portocală și miere și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Tantum Verde cu gust de portocală și miere
3. Cum să luați Tantum Verde cu gust de portocală și miere
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tantum Verde cu gust de portocală și miere
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Tantum Verde cu gust de portocală și miere și pentru ce se utilizează**

Tantum Verde cu gust de portocală și miere conține clorhidrat de benzidamină și poate fi administrat ca tratament analgezic - antiinflamator în afecțiunile cavității bucale și faringelui la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Tantum Verde cu gust de portocală și miere****Nu luați Tantum Verde cu gust de portocală și miere**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);
- dacă sunteți alergic la acid acetilsalicilic și/sau la alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).

### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Tantum Verde cu gust de portocală și miere, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Aveți grijă deosebită când luați Tantum Verde cu gust de portocală și miere:

- dacă aveți un istoric de astm.

### **Tantum Verde cu gust de portocală și miere împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Nu s-au semnalat interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament.

Nu trebuie să utilizați Tantum Verde cu gust de portocală și miere în timpul sarcinii, decât dacă este absolut necesar și la recomandarea medicului dumneavoastră. Dacă tratamentul este necesar, trebuie utilizată cea mai mică doză posibilă pentru cea mai scurtă perioadă de timp.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Utilizarea locală a benzidaminei la dozele recomandate nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Tantum Verde cu gust de portocală și miere conține izomalt (care este un tip de zahăr).**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

**Tantum Verde cu gust de portocală și miere conține un colorant numit galben amurg (E 110) care poate provoca reacții alergice.**

Acest medicament conține aromă cu citral, citronelol, d-limonen, geraniol, linalool. Aceștia pot determina reacții alergice.

## **3. Cum să luați Tantum Verde cu gust de portocală și miere**

Luăți întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza uzuală recomandată este de o pastilă Tantum Verde cu gust de portocală și miere de 3 ori pe zi. Pentru obținerea efectului maxim, este indicat să se lase pastila să se dizolve în gură.

### *Utilizarea la copii și adolescenți*

Din cauza pericolului de sufocare (prin alunecarea pastilei în căile respiratorii), administrarea pastilelor la copiii între 6-12 ani se face numai sub supravegherea unui adult.

Nu este recomandată administrarea pastilelor la copiii cu vârsta sub 6 ani.

### *Durata tratamentului*

Durata tratamentului nu trebuie să fie mai mare de 7 zile.

Dacă după administrarea Tantum Verde cu gust de portocală și miere simptomele nu se ameliorează sau se agravează trebuie să discutați cu medicul sau farmacistul dumneavoastră.

### **Dacă luați mai mult Tantum Verde cu gust de portocală și miere decât trebuie**

Trebuie să vă adresați imediat medicului.

### **Dacă uitați să luați Tantum Verde cu gust de portocală și miere**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să luați Tantum Verde cu gust de portocală și miere**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

**Reacții adverse mai puțin frecvente** (pot afecta până la 1 din 100 persoane) poate să apară fotosensibilitate (sensibilitate la lumină).

**Reacții adverse rare** (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

Poate să apară senzație de arsură și uscăciune a mucoasei bucale.

Dacă vi se întâmplă dumneavoastră, beți un pahar cu apă pentru a reduce aceste senzații.

**Reacții adverse foarte rare** (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

Trebuie să discutați imediat cu medicul dacă brusc vi se umflă gura sau gâtul, sau apar dificultăți la respirație.

### **Reacții adverse cu frecvență necunoscută:**

- reacție alergică (hipersensibilitate);

- reacție alergică gravă (șoc anafilactic), semne care pot include dificultăți de respirație, dureri în piept sau senzație de apăsare în piept și/sau senzație de amețală/leșin, mâncărime severă a pielii sau noduli formați pe piele, umflare a feței, buzelor, limbii și/sau gâtului și care pot pune viața în pericol.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Tantum Verde cu gust de portocală și miere**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau folie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 30° C, în ambalajul original pentru a fi ferit de umiditate.

Nu utilizați Tantum Verde dacă observați semne vizibile de deteriorare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.**

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Tantum Verde cu gust de portocală și miere**

- Substanța activă este clorhidratul de benzidamină. Fiecare pastilă conține clorhidrat de benzidamină 3 mg.
- Celelalte componente sunt: izomalt, acesulfam potasic, acid citric monohidrat, aromă de portocală, aromă de miere, levomentol, galben de chinolină (E 104), galben amurg (E 110).

#### **Cum arată Tantum Verde cu gust de portocală și miere și conținutul ambalajului**

Tantum Verde cu gust de portocală și miere se prezintă sub formă de pastile pătrate, translucide, prevăzute cu o cavitate centrală, de culoare galben-portocaliu, cu gust de portocală-miere.

Este disponibil în cutii cu 2 pachete sub formă de baton, acoperite cu folie trilaminată (hârtie-PE-aluminiu) a câte 10 pastile fiecare; cele 10 pastile sunt ambalate individual în hârtie parafinată.

Este disponibil în cutii cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 pastile.

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

##### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

ANGELINI PHARMA S.p.A.

Viale Amelia, 70, 00181 Roma, Italia

##### **Fabricantul**

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.,

Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona, Italia

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață.

**Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2026.**